

# DOSIS RECUERDO/ADICIONAL COVID-19

Dosis adicional: Muy alto riesgo / Dosis recuerdo: Inmunosenescencia

## ¿A QUIÉN?

### Vacunados con:

- 2 ARNm
- 2 AZ
- heteróloga 1 AZ+1 ARNm
- 1 Janssen

**Personas de muy alto riesgo**  
(grupo 7 y tratamiento inmunosupresor)

ARNm (0,3 ml Comirnaty / Spikevax (0,5 ml))

- Trasplante de órgano sólido.
- Hemodiálisis y diálisis peritoneal.
- Tratamiento quimio y radioterápico (en los 6 meses previos).
- Inmunodeficiencias primarias.
- IH  $\leq$  200 cel/ml (últimos 6 meses).
- Fibrosis quística. Síndrome de Down (nacidos  $\leq$  1981).
- Tratamiento inmunosupresor

- TPH (Trasplante de progenitores hematopoyéticos) CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-Cell)

## ¿CÓMO?

1 dosis adicional ARNm  $\geq$  28 días de la última dosis  
1 dosis de recuerdo 5 meses después de la adicional

### TPH en los 2 años previos vacunados después del TPH

1 dosis adicional  $\geq$  28 días desde 2ª dosis  
1 dosis de recuerdo  $\geq$  5 meses después de la adicional

### TPH reciente y vacunados antes del TPH

Revacunación completa con 3 dosis:  
1ª dosis a los 3-6 meses del TPH  
2ª dosis a los 21/28 días de la 1ª dosis (según vacuna)  
Dosis adicional a los  $\geq$  28 días de la 2ª dosis  
1 dosis de recuerdo  $\geq$  5 meses después de la adicional

### TPH no vacunados previamente

Pauta completa con 3 dosis:  
1ª dosis lo antes posible  
2ª dosis a los 21/28 días de la 1ª dosis (según vacuna)  
Dosis adicional a los  $\geq$  28 días de la 2ª dosis  
1 dosis de recuerdo 5 meses después de la adicional

1 dosis recuerdo ARNm  $\geq$  5 meses de la última dosis

1 dosis recuerdo ARNm.

Pauta ARNm:  $\geq$  5 meses de la última dosis

1 dosis recuerdo ARNm  $\geq$  3 meses de la última dosis

## ¿CON QUÉ VACUNA?

### Dosis adicional:

ARNm (0,5 ml Moderna/  
0,3 ml Pfizer)

### Dosis recuerdo:

ARNm (0,25 ml Moderna/  
0,3 ml Pfizer)

### SI INFECCIÓN SARS-COV-2 (PREVIA O ACTUAL)

dosis adicional ARNm  $\geq$  28 días de la última dosis y después de finalizar aislamiento y síntomas

dosis recuerdo ARNm  $\geq$  5 meses de la última dosis y después de 4 semanas de la infección

dosis recuerdo ARNm  $\geq$  3 meses de la última dosis y 4 semanas después de la infección

## ¿QUÉ TENER EN CUENTA?

Se puede administrar con vacuna antigripal, antineumocócica y con otras vacunas:

**A la vez, en diferentes extremidades o sin ningún intervalo de tiempo.**

## ¿CÓMO REGISTRAR?

Según orden de dosis: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª o 5ª

Estrategia de vacunación frente a COVID-19 en España. Actualización 10. Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. 27-12-2021; Dosis de recuerdo frente a COVID-19; próximos grupos a vacunar. 16-12-2021; Guía sobre utilización de vacunas para personal sanitario. Estrategia de Vacunación frente a COVID-19. 23-12- 2021.



ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA

